

90 jours à Kerguelen #8

Identifier les espèces d'oiseaux

Pour compter les oiseaux et pour pouvoir comparer les comptages entre eux, il faut être capable d'identifier les différentes espèces. Certaines ne posent pas de problème. Très faciles à identifier, toute confusion est impossible. Le damier du Cap, avec son plumage noir et blanc, en fait partie.

D'autres espèces sont plus compliquées à reconnaître, et il faut un peu d'entraînement pour éviter les erreurs. La connaissance des aires de répartition aide beaucoup. Même s'ils se déplacent sur de très longues distances, tous les oiseaux

marins ne se rencontrent pas partout en mer. Les oiseaux tropicaux habitent les eaux chaudes, les oiseaux polaires les eaux froides. Certaines espèces peuvent se rencontrer tout autour du globe, d'autres seulement dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique. Les saisons comptent aussi beaucoup. Le pétrel à menton blanc et l'albatros à sourcils noirs, par exemple, sont très communs lors des rotations d'été, car ils nichent en nombre sur Crozet et Kerguelen. Pendant la rotation hivernale, nous n'en voyons aucun.



◀ Il existe deux espèces de pétrels géants, le pétrel géant antarctique et le pétrel de Hall. Les deux ont un plumage variable, plus ou moins clair, mais seul le pétrel géant antarctique peut être blanc moucheté de noir. Le meilleur moyen de les différencier est le bout du bec. Le pétrel de Hall, à gauche (posé et en vol), a le bout du bec rougeâtre, le pétrel géant antarctique, à droite, a le bout du bec verdâtre. Quand ils sont en vol, il est parfois difficile de bien voir le bec, l'identification n'est donc pas toujours possible.



Pour identifier une espèce la taille de l'oiseau est importante. Mais elle est parfois difficile à estimer, surtout en mer où l'œil manque de points de repère pour évaluer les distances. Il faut ensuite regarder la forme générale, celle du bec, des ailes, de la queue... La plupart des oiseaux marins sont noirs, blancs ou brun plus ou moins foncé. La

répartition de ces couleurs permet généralement de différencier les espèces.

De plus, tous les oiseaux ne se comportent pas de la même manière. Les allures générales sont souvent différentes, les façons de voler aussi. Reconnaître les planés ou les battements d'ailes des oiseaux peut être très utile pour les identifier.



◀ Même vu de loin, le damier du Cap est très facile à reconnaître, grâce à sa petite taille et son plumage noir et blanc.

▼ Les ailes fines et la queue pointue des albatros fuligineux leur donnent une silhouette très particulière. Les albatros fuligineux à dos clair, ici en vol devant l'île de l'Est de Crozet, se différencient de ceux à dos sombre grâce à leur corps marron clair très visible.





▲ Certains albatros ont le dos sombre. Parmi ceux-ci, quelques espèces sont faciles à identifier. L'albatros à sourcils noirs (en haut à gauche) se reconnaît à son bec orange vif et à ses sourcils noirs. L'albatros timide (en haut à droite) est plus grand et son bec n'est pas orange, mais ce nom cache plusieurs espèces très proches difficiles à reconnaître. Les grandes espèces d'albatros ont généralement le dos blanc. Mais les plumages peuvent être variables. L'albatros hurleur devient de plus en plus blanc en vieillissant. Les plus jeunes (en bas à gauche) ont le dos blanc et les ailes marrons. Avec les années, les ailes blanchissent (images du milieu). Les plus jeunes peuvent être confondus avec l'albatros d'Amsterdam (en bas à droite), qui reste marron même avec l'âge.



Les prions sont des petits pétrels. Toutes les espèces sont très proches. Elles se reconnaissent à la forme et à la taille du bec et aux motifs noirs et blancs de la tête. Mais plusieurs espèces sont d'apparence trop semblable pour être reconnues en mer. Lors des comptages, nous notons seulement "prion", sans préciser de nom d'espèce.

En haut à gauche : Un oiseau qui est soit un prion de Salvin soit un prion de la Désolation.

En haut à droite : Cet oiseau est probablement un prion colombe, mais peut être un prion fulmar.

À droite : Deux prions de différentes espèces pêchent côte à côte.

En bas : Cet oiseau est peut être un prion de Salvin. Après une courte plongée, il ressort de l'eau avec une petite crevette dans le bec.

